

Nouvelle société cotonnière du Togo

COTON ACTU EXPRESS

Septembre 2013

Bulletin d'information à l'usage des journalistes

La Campagne de production cotonnière est entamée depuis le 23 mai 2013. Cette campagne est essentiellement marquée par une anomalie climatique sur le plan national. Cette anomalie se caractérise non seulement par la rareté des pluies mais aussi et surtout par leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Du fait de ces changements, les travaux d'entretiens culturaux et de traitement phytosanitaire ont été décalés dans le temps.

Si les différentes phases de la culture ainsi que l'application des techniques culturales sont les mêmes sur toutes l'étendue du territoire, ces applications sont quelques peu différentes suivant les zones culturales. Les incidences des anomalies pluviométriques sur la campagne, sont susceptibles d'influencer fortement les résultats de la campagne.

SOMMAIRE

- ◆ **Poursuite de la Campagne de Production.**
- ◆ **Les 1^{er} Chiffres sur la campagne : les semis.**

Dans la Région cotonnière Nord.

En dehors des considérations liées aux anomalies climatiques, dans la région cotonnière nord, le cotonnier poursuit sa croissance. On assiste déjà à l'ouverture des capsules.

Les cotonculteurs procèdent au traitement contre le deuxième pic « **héliothis** » qui est une chenille donnée par un papillon. Ce parasite est maîtrisé grâce à l'utilisation du produit EMACOT.



Héliothis sur une capsule coton.

Dans la Région cotonnière Centre.

Ici, outre le décalage dans les semis, il est à noter que le cotonnier est à l'étape de la floraison et de la formation des capsules. Les cotonniers subissent des attaques de

parasites tels que « **les vers roses** », « **les pucerons** », « **l'Earias** » et « **l'héliothis** »



VER ROSE OU PECTINOPHORA GOSSYPIELLA

Dans la Région cotonnière Sud.

C'est la Région cotonnière Sud qui a plus subi les conséquences de la rareté des pluies. Pendant 45 jours durant, les producteurs ont attendu en vain la pluie, autant dans la zone plateau-sud que dans la maritime. Depuis le début du mois de septembre, les pluies ont repris dans l'ensemble de la région. Ainsi, les opérations

culturales ont subi quelques retards sur le calendrier tel



recommandé par l'encadrement. Dans la zone plateau-sud, le cotonnier est au stade des boutons floraux tandis que dans la



maritime, certains cotonculteurs en sont encore à l'étape de la fumure. (Épandage d'engrais). Dans ce cas il leur est

conseillé de fumer directement avec un mélange du NPKSB et de l'Urée, opération qui en temps normal se fait séparément. De même, les traitements insecticides ont aussi pris du retard. Il est noté une infestation de puceron et d'earias et d'apparition de vers rose et d'héliothis sur les parcelles coton.

LA CAMPAGNE COTONNIERE EN QUELQUES CHIFFRES

SITUATION DEFINITIVE DES SEMIS ET NOMBRE DE PRODUCTEURS ENGAGES

	OBJECTIFS DE SEMIS	SEMIS DEFINITIFS (ha)	NOMBRE DE PRODUCTEURS
REGION COTONNIERE NORD	55.000 (ha)	52.873 (ha)	56.522
REGION COTONNIERE CENTRE	20.000 (ha)	20.371 (ha)	19.946
REGION COTONNIERE SUD	35.000 (ha)	29.141 (ha)	26.874
TOTAL NATIONAL	110.000 (ha)	102.385 (ha)	103.342

Observations :

1. La situation définitive des semis est de 102,385 hectares, contre 122,041 hectares la campagne 2012/13.
2. Les objectifs de superficie de la campagne s'élevaient à 110,000 hectares. La non réalisation de ces objectifs est liée à la mauvaise pluviométrie.

SOURCE : NSCT

DIRECTION GENERALE/

Pour tout renseignement : Tél (228) 24400153 Ext 1172/ cotonactuexpress.nsct@gmail.com/nsct_dgat@togo-imet.com/